

الأمراض التي يعرض على طفلك الحصول على لقاح ضدها

| عدد الوخزات | المرض | عمر الطفل |
|----------------|---|-----------|
| 0 (1) | فيروس الروتا (لقاح للشرب) السلل للأشخاص من الفئات المعرضة للخطر | 6 أسابيع |
| 2 | فيروس الروتا • دفتريا • كزاز • سعال ديكي • شلل الأطفال • المستدمية النزلية • التهاب الكبد B • مرض المكورات الرئوية | 3 شهور |
| 2 | دفتريا • كزاز • سعال ديكي • شلل الأطفال • المستدمية النزلية • التهاب الكبد B • مرض المكورات الرئوية | 5 شهور |
| 2 | دفتريا • كزاز • سعال ديكي • شلل الأطفال • المستدمية النزلية • التهاب الكبد B • مرض المكورات الرئوية | 12 شهرا |
| 1 | حصبة • نكاف • حصبة ألمانية | 15 شهرا |

قبل وبعد التلقيح

قم بإخطار الممرضة إذا

- كان الطفل يعاني من حساسية أو مشاكل صحية أخرى
- كان طفلك قد تناول دواءً أو حصل على لقاحات أخرى مؤخراً
- كانت أم الطفل قد تناولت أدوية تضعف من جهاز المناعة أثناء الحمل و/أو أثناء الرضاعة الطبيعية

بعد التطعيم، ينبغي على المرء أن ينتظر 20 دقيقة قبل مغادرة المركز الصحي.

بعد التطعيم، تظهر ردود فعل خفيفة أو لا تظهر أية ردود فعل عند معظم الأطفال، لكن عند البعض قد تظهر ردود فعل خفيفة أو عابرة، مثل الحمى الخفيفة. إذا كان الطفل يعاني من حمى أعلى من 39 درجة مئوية و/أو من وهن عام، فقد يكون هذا علامة على وجود مرض خطير وليس بالضرورة رد فعل على اللقاح. لذلك استشر الطبيب إذا كنت قلقاً على الطفل.

اللقاح المركب

يتم إعطاء العديد من اللقاحات في البرنامج في حقنة واحدة تسمى باللقاح المركب. هذا يعني عدد أقل من الوخزات للطفل. كما تسبب اللقاحات المركبة ردود فعل أقل في مكان الوخز مقارنة باللقاحات التي تعطى بشكل منفصل.

برنامج التلقيح للأطفال في سن المدرسة

يتلقى الطفل خلال المرحلة الابتدائية عرضاً بإعطائه جرعات داعمة من بعض اللقاحات. في الصف السابع، يُعرض على الطفل لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

نظرة عامة على اللقاحات التي حصل عليها الطفل

يتم تسجيل جميع اللقاحات التي يحصل عليها الطفل في سجل التطعيم الوطني سيسفاك SYSVAK. ويمكن الاطلاع على لمحة عامة عن لقاحات الطفل في الموقع www.helsenorge.no

اسأل الممرضة إذا كنت لديك تساؤلات.

اقرأ المزيد على الموقع: www.fhi.no/om-bvp (باللغة النرويجية فقط)